REVISÃO			CONSÓRCIO	
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DATA	APR.
	/ /		/ /	
	/ /		/ /	
	/ /		/ /	
	/ /		/ /	



Legenda

- CXbd - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, A moderado, textura média, álico, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo ondulado e suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico, A moderado e proeminente, fase Vereda Tropical, relevo plano.
- LVd1 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura argilosa e média, fases Campo Cerrado Tropical e Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo plano.
- LVd2 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura média, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado (Inclusão de NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico).
- RLd1 - NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, A moderado, textura média cascalhenta, álico, substrato rochas pelíticas, fases pedregosa e Cerrado Tropical Caducifólio, relevo suave ondulado e ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA, fase Campo Cerrado Tropical, relevo ondulado e forte ondulado.
- RLd2 - NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, A moderado, textura arenosa e média, substrato arenito, fases pedregosa e não pedregosa, rochosa e não rochosa e Campo Cerrado Tropical, relevo forte ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA, fase Campo Cerrado Tropical, relevo forte ondulado.
- RQo1 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, álico, fase Campo Cerrado e Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado.
- RQo2 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, álico, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio e Campo Cerrado Tropical, relevo suave ondulado e plano.
- RQo3 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, álico, fases Cerrado Tropical Subcaducifólio e Campo Cerrado Tropical, relevo suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, A moderado, textura arenosa e média, fases pedregosa, rochosa Campo Cerrado Tropical, relevo forte ondulado.
- RQo4 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, álico, fase Campo Cerrado Tropical, relevo suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico, A húmico, fases Vereda Tropical, relevo plano e suave ondulado.
- RQo5 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, álico, fases Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo suave ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA relevo forte ondulado e escarpado.
- RQg1 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico, A moderado e húmico, epiálico, fase Vereda Tropical, relevo plano e suave ondulado.
- RQg2 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico, A húmico e moderado, epiálico, fase Vereda Tropical, relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico hístico, fase Vereda Tropical, relevo plano.
- AR1 - AFLORAMENTOS DE ROCHA, fase Campo Cerrado Tropical, relevo forte ondulado.
- AR2 - AFLORAMENTOS DE ROCHA, fase Campo Cerrado Tropical, relevo escarpado e forte ondulado.

Pontos Amostrais

- ■ Perfil Completo
- ▲ Amostra Extra

Convenções Cartográficas

- Rodovia: Leito natural, Federal e Estadual
- Estadual
- Área Urbana
- Limite da Apa Jalapão
- Drenagem

Base Cartográfica

Folhas IBGE / DSG - 1:250.000

Lizarda	SC-23-V-C
Gilbués	SC-23-V-D
Ponte Alta do Norte	SC-23-Y-A
Corrente	SC-23-Y-B

Escala Gráfica

2,5 0 2,5 5 7,5 10km

1:250.000

Fonte: Trabalho elaborado por Virlei A. de Oliveira com base em trabalhos de campo e interpretação de imagens de satélite Landsat/2002

PROJ. M. MACHADO	VER.PROJ. J. ROBERTO	APROV.
DES. FLÁVIA	VER.DES. IDELMA	DATA AGOSTO/2003
RESPONSÁVEL TÉCNICO FAUSTO N. M. SARMENTO		Nº CREA UF 857 /D-GO
GERENTE DE CONTRATO FAUSTO N. M. SARMENTO		Nº CREA UF 857 /D-GO
APROVADO	DATA	

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO JALAPÃO

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

MAPA DE RECONHECIMENTO DE ALTA INTENSIDADE DOS SOLOS

FL 1/1

Nº CTE	REVISÃO
065-AJL-05-205-DE-001	R 0